Desinfektionsplan

Musterplan Behandlungszimmer des Arztes

PUSH Virtual Rooms

Stand: Januar 2024

Was?	Wann?	Womit?		Wie?
Maßnahme	**Häufigkeit**	**Produkt**	**EWZ / Konz.**	**Durchführung**
Hygienische Hände-desinfektion	Vor Patientenkontakt - aseptischen Tätigkeiten. Nach Patientenkontakt - Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung, Kontakt mit potentiell infektiösen Materialen auch nach Ablegen von Einmalhandschuhen.	**Sterillium classic pure**	30 Sek. | gebrauchsfertig	Präparat in die trockene, hohle Hand geben, über die gesamte EWZ bis zu den Handgelenken einreiben und feucht halten. Fingerkuppen, Daumen und Zwischenräume besonders beachten.
Händewaschung	Vor Arbeitsbeginn. Nach Toilettenbesuch. Bei Verschmutzung.	**Baktolin Pure**	| gebrauchsfertig	Hände anfeuchten, Produkt entnehmen, aufschäumen, gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
Handschuhe	Je nach Arbeitsbereich: allergenarme, möglichst ungepuderte, flüssigkeits- bzw. chemikalien-dichte Schutzhandschuhe verwenden. Bei möglichem Kontakt mit erregerhaltigem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen). Bei allen Arbeiten mit Desinfektions- und Reinigungslösungen (Achtung: Handschuhstulpen umschlagen!). Bei Umgang mit Lebensmitteln.	**Peha-soft nitrile white**		Handschuhe stets mit vollständig trockenen Händen anziehen. Tragedauer nach Herstellerangaben beachten. Beschädigte bzw. von innen feuchte Handschuhe schnellstmöglich wechseln.
Hautantiseptik	Vor allen Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen und vor allen Eingriffen und Operationen an talgdrüsenarmer Haut.	**Cutasept F**	mind. 1 Min. | gebrauchsfertig	Hautareal satt benetzen und über EWZ feucht halten.
Fläche allgemein	Bei Wechsel. Nach Kontamination.	**Bacillol 30 Sensitive Tissues**	1 Min. | gebrauchsfertig	Nach der Feucht-Wischmethode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
Behandlungsliege	Nach Benutzung. Nach Kontamination.	**Bacillol 30 Sensitive Tissues**	1 Min. | gebrauchsfertig	Papierauflage entsorgen. Nach der Feucht-Wischmethode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
Kontaktflächen: Handläufe, Türgriffe, Schalter, Notruf	Täglich. Nach Kontamination.	**Bacillol 30 Sensitive Tissues**	1 Min. | gebrauchsfertig	Nach der Feucht-Wischmethode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
Fußboden	Täglich. Nach Kontamination.	**Mikrobac forte**	1 Std. | 0.50%	Nach der Feucht-Wischmethode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.

Möchten Sie einen individuell für Ihre Einrichtung erstellten Desinfektionsplan, können Sie sich hier für unser PUSH Hygiene registrieren: www.hartmann.de/healthplus

Wir forschen für den Infektionsschutz
Tel. +49 40 54006-111, Fax-777
science-center@hartmann.info

Die BGR 250, TRBA 250, das MPG, IfSG und die RKI-Richtlinien müssen berücksichtigt werden.